



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



JUNTA DE ANDALUCÍA



Productos y Apósitos para Prevención y Tratamiento de **Úlceras Por Presión**

Manual de Uso e Indicaciones



Grupo de Trabajo de Deterioro de la Integridad Cutánea
Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar

El objetivo de este “Manual de Uso e Indicaciones de Productos y Apósitos para la Prevención y Tratamiento de Úlceras por Presión”, es fruto de un consenso de profesionales de Enfermería de nuestra Área Sanitaria con amplia experiencia en este tema que abordamos. Se ha intentado con ello, materializar una herramienta que a la vez que ayude al profesional en la toma de decisiones, en las indicaciones y posología de cada apósito, también sirva para el uso eficiente y disminución de la variabilidad en la práctica clínica de los cuidados que prestamos a los pacientes, tanto en Atención Primaria como Hospitalaria y en centros sociosanitarios.

Este Manual está dividido en dos grandes bloques: un bloque dedicado a los productos y apósitos orientados a la prevención y cuidados de la piel, y el otro bloque hacia el tratamiento de la herida. La principal intención es disponer de una herramienta Fácil, Accesible, Segura, y basada en las mejores Evidencias disponibles, que facilite el trabajo y estandarice los cuidados que prestan los profesionales de enfermería con conocimientos básicos sobre el manejo de este tipo de lesiones.

Avanzar en la Seguridad del Paciente y en la mejora de la calidad de los cuidados es una prioridad para nuestro Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), para ello es importante generar una cultura de traslación del conocimiento y su implementación en la práctica clínica diaria.

Esperamos que este Manual facilite vuestra labor profesional en el desarrollo de los cuidados y que con vuestra implicación y calidad en la atención podamos implementar una cultura de prevención, que posibilite que nuestros pacientes gocen de una calidad de los cuidados que minimicen la aparición de este tipo de lesiones.

Agradecimientos

A todos aquellos profesionales de enfermería, que de una forma o de otra intervienen en la prestación de cuidados a los pacientes que se atienden en todas las Unidades del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar, tanto a nivel hospitalario, atención primaria y centros sociosanitarios, que posibilitaron con sus inquietudes y demandas que este grupo de trabajo haya realizado este “Manual de Uso e Indicaciones de Productos y Apósitos para la Prevención y Tratamiento de Úlceras por Presión”, y que sin ellos no sería posible su desarrollo e implementación. Gracias a todos.

Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar.
Grupo trabajo Deterioro de la Integridad Cutánea.

Colores reseñas de cómo interpretar el manual.

Dos bloques:

VERDE: PRODUCTOS Y APÓSITOS UTILIZADOS EN PREVENCIÓN DE UPP

ROJO: PRODUCTOS Y APÓSITOS UTILIZADOS EN TRATAMIENTO DE UPP

CONTROL DEL TEJIDO NO VIABLE/ PREPARACIÓN DEL LECHO DE LA HERIDA / DESBRIDAMIENTO

CONTROL DE LA INFECCIÓN Y DE LA CARGA BACTERIANA

MANEJO Y GESTIÓN DEL EXUDADO

FAVORECIMIENTO EPITELIZACIÓN Y CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL

Para descargar esta guía:

<https://goo.gl/LMe6nW>



Para descargar el poster:

<https://goo.gl/Y09mqP>



PRODUCTOS Y APÓSITOS UTILIZADOS EN PREVENCIÓN DE UPP

PRODUCTOS UTILIZADOS EN PREVENCIÓN	GENÉRICO CENTRO	NOMBRE GENERICO PRODUCTO/APÓSITO	NOMBRE COMERCIAL	INDICACIONES
	D54121	AGHO (ácido graso hiperoxigenado)	CORPITOL® 3.27 €/ud. 	Solución para la prevención y tratamiento de las úlceras por presión de Estadio I. Aplicación según protocolo de prevención. Uso hospitalario.
	D66658	PBNI películas de barrera no irritantes	CAVILON® 7.70 €/ud. 	Película líquida transparente, transpirable que protege contra adhesivos, humedad y fluidos corporales hasta por 72 horas. Seca rápidamente (30 segundos).
	D86029	Pomadas de Zinc	CONVEEN® 2.53 €/ud. 	La crema de barrera forma una película que protege la piel frente a efluentes corporales. Aplicación según protocolo de prevención.

PRODUCTOS Y APÓSITOS UTILIZADOS EN PREVENCIÓN DE UPP

PRODUCTOS UTILIZADOS EN PREVENCIÓN

GENÉRICO CENTRO	NOMBRE GENÉRICO PRODUCTO/APÓSITO	NOMBRE COMERCIAL	INDICACIONES
E85768	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y POLIACRILATO CON SILICONA-BORDES ADH:SI	BIATAIN SILICONA® 15X15 cm. 10 uds. x caja (4.29 €)	Prevenção sobre prominencias óseas o zonas sometidas a presión y/o fricción.
E67980	APÓSITO ESPUMA POLIURETANO CODO-TALON-BORDES ADH:NO	ALLEVYN HEEL® 3 uds. x caja (4.40 €)	Cambio apósito c/ 48-72 h. Se puede <u>levantar</u> para visualizar
E65251	APÓSITO DE HIDROCOLOIDE-BORDES ADH:NO GROSOR FINO: (0-1 mm)	VARIHESIVE EXTRA FINO® 15 x 15 cm. 10 uds. x caja (1.49 €)	Prevenção sobre prominencias óseas sometidas a fricción. Cambio c/48-72 h.
E65056		VARIHESIVE EXTRA FINO® 10 x 10 cm. (0.72 €)	
E64313	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO-SILICONA-CON FIBRAS C/B	MEPILEX BORDER® 15X15 cm. (3.9 €)	Prevenção sobre prominencias óseas o zonas sometidas a presión y/o fricción.
E64314		MEPILEX BORDER® 10X10 cm. (1.95 €)	

PRODUCTOS Y APÓSITOS UTILIZADOS EN TRATAMIENTO DE UPP

CONTROL DEL TEJIDO NO VIABLE/ PREPARACIÓN DEL LECHO DE LA HERIDA / DESBRIDAMIENTO

CONTROL DEL TEJIDO NO VIABLE
FASE DE DESBRIDAMIENTO

GENÉRICO CENTRO	NOMBRE GENÉRICO PRODUCTO/APÓSITO	NOMBRE COMERCIAL	INDICACIONES
F16391	COLAGENASA	 <p>IRUXOL® 3.20 €/ud.</p>	<p>DESBRIDAMIENTO ENZIMÁTICO de los tejidos necrosados en úlceras cutáneas.</p> <p>Aplicar una capa de pomada de aproximadamente 2 mm de espesor una vez al día, directamente sobre la zona a tratar ligeramente humedecida por ejemplo con hidrogel o suero fisiológico.</p>
E64932	APÓSITO DE HIDROGEL AMORFO	 <p>PURILON® 10 uds. x caja. (0.90 €)</p>	<p>Para lesiones poco exudativas o cavitadas. DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO y ayuda al enzimático.</p>
E64737	APÓSITO DE FIBRAS DE POLIACRILATO-BORDES ADH:NO	 <p>URGOCLEAN® 10 x 10 cm. 10 uds. x caja (3.08 €)</p>	<p>Indicado para el desbridamiento de heridas con gran cantidad de fibrina en el lecho de la herida y exudado moderado-elevado. Heridas en fase de desbridamiento.</p> <p>DESBRIDAMIENTO HIDROTERSIVO. Cambio cada 1-2 días en fase de desbridamiento.</p>

PRODUCTOS Y APÓSITOS UTILIZADOS EN TRATAMIENTO DE UPP

CONTROL DE LA INFECCIÓN Y DE LA CARGA BACTERIANA

CONTROL DE LA INFECCIÓN Y DE LA CARGA BACTERIANA	GENÉRICO CENTRO	NOMBRE GENÉRICO PRODUCTO/APÓSITO	NOMBRE COMERCIAL	INDICACIONES
	E65326	APÓSITO DE ALGINATO–BORDE ADH:NO	BIATAIN ALGINATO AG® 15 x 15 cm. (2,41 €) 	Heridas exudativas o muy exudativas infectadas o que presenten colonización crítica o alto riesgo de infección.
	E64663	APÓSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA	AQUACEL AG+® 15 x 15 cm. (6,05 €) 	
	E64662		AQUACEL AG+® 10x10 cm. (2.42 euros) 	
	E64846		AQUACEL AG+® cinta 2 x 45 cm. (2,95 €) 	Cambios según gestión del exudado. Cada 24-48 h.

PRODUCTOS Y APÓSITOS UTILIZADOS EN TRATAMIENTO DE UPP

MANEJO Y GESTIÓN DEL EXUDADO

MANEJO Y GESTIÓN DEL EXUDADO	GENÉRICO CENTRO	NOMBRE GENÉRICO PRODUCTO/APÓSITO	NOMBRE COMERCIAL	INDICACIONES	
	E65274	APÓSITO REGENERATIVO ALGINATO DE CALCIO	BIATAIN ALGINATO® 15 x 15 cm. (2,34 €)		Lesiones exudativas, especialmente profundas o cavitadas. Por su carácter hemostático tras desbridamiento cortante con sangrado. Cambios según gestión del exudado. Cada 24-48 h.
	E64651	APÓSITO REGENERATIVO HIDROFIBRA ALTA HIDRATACIÓN	AQUACEL EXTRA® 10x 10 cm. (2,42 €)		Lesiones exudativas, especialmente profundas o cavitadas. Cambios según gestión del exudado. Cada 24-48 h.
	E64913		AQUACEL EXTRA® 5 x 5 cm. (0,71 €)		
E64543		AQUACEL® cinta 2 x 45 cm. (1,37 €)			

NECESITAN DE UN APÓSITO SECUNDARIO

PRODUCTOS Y APÓSITOS UTILIZADOS EN TRATAMIENTO DE UPP

MANEJO Y GESTIÓN DEL EXUDADO

MANEJO Y GESTIÓN DEL EXUDADO	GENÉRICO CENTRO	NOMBRE GENÉRICO PRODUCTO/APÓSITO	NOMBRE COMERCIAL	INDICACIONES	
	E64544	APÓSITO DE HIDROFIBRA C/ESPUMA POLIURETANO	AQUACEL FOAM® ADH 17.5 x 17.5 cm. (4.75 €)		Apósito primario en heridas con exudado leve o moderado.
	E64546		AQUACEL FOAM® ADH 12.5 x 12.5 cm. (2.28 €)		Apósito secundario en heridas con exudado moderado o abundante.
	E65104		AQUACEL FOAM® NO ADH 15 x 15 cm. (4.21 €)		Cambios según exudado o máximo 7 días.
	E64313	APÓSITO DE ESPUMA POLIURETANO-SILICONA CON FIBRAS C/B	MEPILEX BORDER® 15X15 cm. (3.9 €)		Apósito primario en heridas con exudado moderado-alto.
	E64314		MEPILEX BORDER® 10X10 cm. (1.95 €)		Apósito secundario con exudado muy alto o infección. Cambio cada 48/72 h.
E65002	APÓSITO DE ESPUMA POLIURETANO MICROADHERENTE CICATRIZANTE	URGOTUL ABSORB® 10X12 cm. (1.35 €)		Apósito primario en fase de granulación o epitelización con exudado moderado. Cambio cada 2/4 días.	

NO NECESITAN DE UN APÓSITO SECUNDARIO

PRODUCTOS Y APÓSITOS UTILIZADOS EN TRATAMIENTO DE UPP

MANEJO Y GESTIÓN DEL EXUDADO

MANEJO Y GESTIÓN DEL EXUDADO	GENÉRICO CENTRO	NOMBRE GENÉRICO PRODUCTO/APÓSITO	NOMBRE COMERCIAL	INDICACIONES
	E65582	APÓSITO DE ESPUMA POLIURETANO/SACRO-BORDES ADH:SI	BIATAIN ADH SACRO® 17 x 17 cm. 5 uds. x caja (2,64 €)	Prevención sobre prominencias óseas o zonas sometidas a presión y/o fricción. Para lesiones superficiales o profundas. En este caso se pueden asociar a productos que rellenen la cavidad, especialmente si existe exudado moderado-alto. Frecuencia de cambio desde 48h hasta 7 días.
	E67604	APÓSITO DE ESPUMA POLIURETANO-BORDES ADH:SI	TEGADERM® 12 x 12 cm. (1,30 €)	
	E64946	APÓSITO DE ESPUMA POLIURETANO-BORDES ADH:NO	ALLEVYN NO ADH® 15 x 15 cm. (3,97 €) 10 x 10 cm. (2,03 €)	
	E67980	APÓSITO ESPUMA POLIURETANO/CODO-TALÓN	ALLEVYN HEEL® 3 uds. x caja (4.40 €)	



PRODUCTOS Y APÓSITOS UTILIZADOS EN TRATAMIENTO DE UPP

MANEJO Y GESTIÓN DEL EXUDADO

MANEJO Y GESTIÓN DEL EXUDADO	GENÉRICO CENTRO	NOMBRE GENÉRICO PRODUCTO/APÓSITO	NOMBRE COMERCIAL	INDICACIONES
	E65002	APÓSITO DE ESPUMA POLIURETANO MICROADHERENTE CICATRIZANTE	URGOTUL ABSORB® 10X12 cm. (1,35 €) 	Lesiones o heridas crónicas en fase de granulación o epitelización. Cambio cada 2/4 días según nivel de exudado.
	E85768	APÓSITO ESPUMA POLIURETANO Y POLIACRILATO CON SILICONA-BORDES ADH: SI	BIATAIN SILICONA® 15 x 15 cm. (4,29 €) 	Prevención sobre prominencias óseas o zonas sometidas a presión y/o fricción.
	E85769		BIATAIN SILICONA® 10 x 10 cm. (2,12 €) 	
	E64546	APÓSITO DE HIDROFIBRA C/ESPUMA POLIURETANO	AQUACEL FOAM® ADH 12.5 x 12.5 cm. (2,28 €) 	Para lesiones superficiales o profundas. En este caso se pueden asociar a productos que rellenen la cavidad, especialmente si existe exudado moderado-alto. Frecuencia de cambio desde 48h hasta 7 días.
	E65104		AQUACEL FOAM® NO ADH 15 x 15 cm. (4,21 €) 	
	E 64544		AQUACEL FOAM® ADH 17 x 17 cm. (4,75 €) 	

APÓSITOS SECUNDARIOS

PRODUCTOS Y APÓSITOS UTILIZADOS EN TRATAMIENTO DE UPP

MANEJO Y GESTIÓN DEL EXUDADO

MANEJO Y GESTIÓN DEL EXUDADO	GENÉRICO CENTRO	NOMBRE GENÉRICO PRODUCTO/APÓSITO	NOMBRE COMERCIAL	INDICACIONES	
	E65582	APÓSITO DE ESPUMA POLIURETANO/SACRO –BORDES ADH:SI	BIATAIN ADH SACRO® 17 x 17 cm. 5 uds. x caja (2,64 €)		Prevenção sobre prominencias óseas o zonas sometidas a presión y/o fricción. Para lesiones superficiales o profundas. En este caso se pueden asociar a productos que rellenen la cavidad, especialmente si existe exudado moderado-alto. Frecuencia de cambio desde 48h. hasta 7 días.
	E67604	APÓSITO DE ESPUMA POLIURETANO-BORDES ADH:SI	TEGADERM® 12 x 12 cm. (1,30 €)		
	E64945	APÓSITO REGENERATIVO DE POLIMERO HIDROCELULAR	ALLEVYN NO ADH® 15 x 15 cm. (3,97 €)		
	E64946		ALLEVYN NO ADH® 10 x 10 cm. (2,03 €)		
	E67980	APÓSITO ESPUMA POLIURETANO/CODO-TALON	ALLEVYN HEEL® 3 uds. x caja (4.40 €)		

APÓSITOS SECUNDARIOS

PRODUCTOS Y APÓSITOS UTILIZADOS EN TRATAMIENTO DE UPP

FAVORECIMIENTO EPITELIZACIÓN Y CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL

FAVORECIMIENTO EPITELIZACIÓN Y CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL	GENÉRICO CENTRO	NOMBRE GENÉRICO PRODUCTO/APÓSITO	NOMBRE COMERCIAL	INDICACIONES
	E64988 E65534	APÓSITO REGENERATIVO MALLADO IMPREGNADO SILICONA	MEPITEL ONE® 12.5 x 15 cm. (7.64 €) MEPITEL ONE® 6 x 7 cm. (1.64 €)	 Lesiones superficiales o profundas, se pueden asociar a otros productos que rellenen la cavidad, especialmente con exudado moderado-alto.
	E85768 E85769	APÓSITO ESPUMA POLIURETANO Y POLIACRILATO CON SILICONA-BORDES ADH:SI	BIATAIN SILICONA® 15 x 15 cm. (4.29 €) BIATAIN SILICONA® 10 x 10 cm. (2.12 €)	 Indicado en piel perilesional frágil. Cambios según gestión del exudado. Cada 24-48 h.
	D66658	PELICULAS BARRERA NO IRRITANTES	CAVILON®	 Película líquida transparente, transpirable que protege contra adhesivos, humedad y fluidos corporales hasta por 72 horas. Seca rápidamente (30 segundos).

APÓSITOS SECUNDARIOS

En la elaboración de este “Manual de Uso e Indicaciones de Productos y Apósitos para la Prevención y Tratamiento de Úlceras por Presión”, han participado los siguientes profesionales del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar:

Antonio Sánchez Meléndez. Enfermero de Familia y Salud Comunitaria. UGC La Línea Centro “Velada”.

Alfonso Silva Rodríguez. Enfermero Atención Hospitalaria. UGC Medicina Interna.

Sergio M. Calderón Domínguez. Enfermero Familia y Salud Comunitaria. UGC Los Barrios.

Juan Antonio Sánchez Guerrero. Enfermero. Subdirector de Enfermería ÁGS Campo de Gibraltar.

Ceferino Prieto García. Enfermero. Jefe de Bloque Apoyo a la Gestión Cuidados ÁGS Campo de Gibraltar.

También ha colaborado específicamente en el diseño gráfico:

Luis Torrecilla Rojas. Enfermero. Supervisor de Formación ÁGS Campo de Gibraltar.

